

TRES SUBTIPOS DE IMPULSIVIDAD PREDICTORES DE DIFERENTES CONDUCTAS DE RIESGO

THREE SUBTYPES OF IMPULSIVITY PREDICTORS OF DIFFERENT RISK BEHAVIORS

Investigadores USAL:

Squillace, Mario Rodolfo (mario.squillace@usal.edu.ar); Menéndez, Javier Agustín;
Mazzei, Nicolás Jonatan

Palabras clave: conductas de riesgo, impulsividad por imprevisión, CUBI

Keywords: *risky behaviors, impulsivity due to unpredictability, CUBI*

Resumen

Objetivos: relacionar diferentes comportamientos riesgosos de la vida cotidiana con tres subtipos de impulsividad. Tipo de estudio: se trata de un diseño de investigación cuasi experimental (Pereda Marín, 1987) o *ex post facto* (Montero & León, 2005). Método: muestra: conformada por 200 participantes voluntarios de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta constará de una proporción similar de hombres y de mujeres con edades comprendidas en un rango de 16 a los 25 años de edad. Se implementan criterios de inclusión, como que ninguno de los participantes sea psicólogo o estudiante de psicología, para evitar la presencia de variables contaminadoras. Instrumentos: para medir los tres subtipos de impulsividad se aplica el Cuestionario de Urgencia Compulsiva, Búsqueda de Sensaciones e Impulsividad por Imprevisión 18 ítems (CUBI-18, Squillace Louhau & Picón Janeiro, 2019). Para evaluar las conductas de riesgo y las conductas de cuidado se utiliza el Global School-based Student Health Survey (GSHS, World Health Organization, 2013). Procedimiento: se realizará un muestreo por conveniencia (Montero & León, 2005). La participación será voluntaria y confidencial. Como medida de control se realiza un simple ciego: los participantes no saben, durante la recolección de los datos, cuáles son los objetivos e hipótesis del estudio ni que miden exactamente las pruebas suministradas. Se busca así evitar algún tipo de sesgo por expectativas de los participantes durante el llenado de los inventarios.

Abstract

Objectives: Relating different risky behaviors in everyday life with three impulsivity subtypes. Type of study: This is a quasi-experimental (Pereda Marín, 1987) or ex post facto (Montero & León, 2005) research design. Method: Sample: comprising 200 volunteers from the population of the Ciudad Autónoma de Buenos Aires. The sample includes an equal proportion of men and women, ranging from 16 to 25 years of age. Some inclusion criteria are implemented; for instance, none of the participants is a psychologist or psychology student, so as to avoid any polluting variables. Instruments: To measure the three impulsivity subtypes, the Compulsive Urgency Questionnaire - Sensation Search - Impulsivity

by Improvidence - 18 items (CUBI-18, Squillace Louhau & Picón Janeiro, 2019) is applied. To assess risk and caring behaviors, the Global School-based Student Health Survey (GSHS, World Health Organization, 2013) is used. Procedure: A convenience sampling will be carried out (Montero & León, 2005). Participation will be voluntary and confidential. As a control measure, a single-blind study is carried out: the participants are not informed about the study's objectives and hypotheses during data collection, or what is measured by the provided tests during inventory filling.